

帰国生選抜

数 学 問 題

(医 学 部)

注 意 事 項

- 試験開始の合図があるまで、この『数学問題』を開いてはいけません。
- この中には、2枚の下書き用紙と、問題文を含む5枚の解答用紙があります。
- 試験開始後、直ちに、二つ折りになっているすべての用紙を広げてください。
- 問題に落丁、乱丁、印刷不鮮明の箇所があった場合は申し出てください。
- 氏名と受験番号は、すべての解答用紙の所定の欄に必ず記入してください。
- 解答用紙の裏面は計算等の下書きに使用しても構いませんが、解答は各問題の下の解答欄に記入し、裏面は解答に使用しないでください。解答用紙の裏面に解答してもその部分は採点しません。
- 5枚の解答用紙のみを回収しますので、この表紙と2枚の下書き用紙は持ち帰ってください。

下 書 用 紙 (1)

下書用紙(2)


数学

氏名	
受験番号	

- 1 $\triangle OAB$ において、辺 AB 上に 2 つの点をとり、点 A に近い順にそれぞれ P, Q とする。線分 OP と線分 OQ は $\angle AOB$ を 3 等分している。 $\angle AOP$ の大きさを θ とし、さらに線分 AP , 線分 PQ , 線分 QB の長さをそれぞれ x, y, z とする。このとき、 $\sin \theta$ を x, y, z で表せ。

[解答欄]

医 11



$\triangle OPQ$ の面積 S は $\frac{1}{2} OP \cdot OQ \sin \theta$
線分 OP は $\angle AOQ$ の二等分線なので
 $OA : OQ = x : y \therefore OQ = \frac{y \times OA}{x}$
線分 OQ も $\angle POB$ の二等分線なので

$$OP : OB = y : z \therefore OP = \frac{y \times OB}{z}$$

したがって $S = \frac{y^2 \times OB \times OA}{2xz} \sin \theta \quad \dots ①$

他方 $\triangle OPQ$ の面積と $\triangle OAB$ の面積を比較するとき、辺 AB を底辺とみれば

$\triangle OPQ$ の面積は $\triangle OAB$ の面積の $\frac{y}{x+y+z}$ 倍に等しいので

$$S = \frac{y}{x+y+z} \times \frac{1}{2} OA \times OB \sin^3 \theta \quad \dots ②$$

(1), (2) より

$$\frac{y^2}{2xz} \sin \theta = \frac{y \sin 3\theta}{2(x+y+z)} \quad \dots ③$$

ここで $\sin 3\theta = \sin(2\theta + \theta)$

$$= \sin 2\theta \cos \theta + \cos 2\theta \sin \theta$$

$$= 2 \sin \theta \cos^2 \theta + (\cos^2 \theta - \sin^2 \theta) \sin \theta$$

$$= 3 \sin \theta \cos^2 \theta - \sin^3 \theta$$

$$= 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta \text{ なので}$$

(3) より

$$\frac{y^2}{xz} \sin \theta = \frac{y}{x+y+z} (3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta)$$

$$y \neq 0, \text{ また } 0 < 3\theta < \pi \text{ なので}$$

$$\sin \theta \neq 0. \text{ したがって}$$

$$\frac{y}{xz} = \frac{3 - 4 \sin^2 \theta}{x+y+z}$$

ゆえに

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{4} \left\{ 3 - \frac{y(x+y+z)}{xz} \right\}$$

 $\sin \theta > 0$ より

$$\sin \theta = \frac{1}{2} \sqrt{3 - \frac{y(x+y+z)}{xz}}$$

得点

数 学

氏名	
受験番号	

2

M, A, E, B, A, S, H, I の 8 文字を使ってできる文字列について、次の問い合わせに答えよ。ただし、A と A の 2 文字は区別せず、また、8 文字のうち母音は A, E, I である。

- (1) 8 文字すべてを使ってできる文字列はいくつあるか。
- (2) 8 文字すべてを使ってできる文字列のなかで、A が隣り合うものはいくつあるか。
- (3) 8 文字すべてを使ってできる文字列のなかで、どの母音も隣り合わないものはいくつあるか。
- (4) M, A, E, B, S, H, I の 7 文字を 3 組に分ける方法は何通りあるか。ただし、3 組の区別はしない。

[解答欄]

医 [2]

(1) すべて異なる 8 文字からなる文字列は $8!$ 通り。しかし、A と A は区別しないので

$$\frac{8!}{2!} = 20160$$

(2) 2 つの A を 1 つの文字 A とみなせば、すべて異なる 7 文字を使ってできる文字列を考えればよいので

$$7! = 5040$$

(3) 母音を V, 子音を C とかく。8 文字のうち、母音も子音も 4 文字ずつなので、次の 5 つを考えればよい。

- ① CVCV CVCV
- ② VCCVCV CV
- ③ VCVC CV CV
- ④ VCVC VCCV
- ⑤ VCVC VCV C

上の①について、

V の並べ方は $\frac{4!}{2!}$ 。ここで A と A は区別しないので $2!$ で割った。他方 C の並べ方は $4!$ なので

$$\text{①は } \frac{4! \times 4!}{2!}$$

②, ③, ④, ⑤ のどれも全く同じなので

$$\frac{4! \times 4!}{2!} \times 5 = 1440$$

(4) まず、文字 M が 3 つの組のいずれかに属するのは 3 通り。次に文字 A も 3 つの組のいずれかに属するのでやはり 3 通り。どの文字についても 実は 同様で やはり 3 通り。したがって 7 文字を 3 組

に分ける場合の数は 3^7 通り。ただし、当面は 3 組の区別を行っている。この場合の数から 2 組が空、さらに 1 組が空になる場合の数を引く必要がある。

2 組が空になるのは 3 通り。次に、ある特定の 1 組が空になる場合の数は、どの文字も残りの 2 組に分けられるので

$2^7 - 2$ 通り。ここで、2 組のうちのどちらかが空になる場合の数は 2 通りなので、これを書いたことに注意。したがって 3 組のうちのどちらか 1 組のみが空になる場合の数は $(2^7 - 2) \times 3$ 通り。

上では 3 組の区別を行っていたので、したがって求める方法は

$$\frac{3^7 - 3 - (2^7 - 2) \times 3}{3!}$$

$$= 301 \text{ (通り)}$$

得点

数学


氏名	
受験番号	

3

k と l は $0 < k < 1, 0 < l < 1$ を満たす。 $\triangle OAB$ は 1 辺の長さが 1 の正三角形とし、辺 OA を $k : (1-k)$ に内分する点を C 、辺 OB を $l : (1-l)$ に内分する点を D とする。 O を通り直線 CD に垂直な直線と、直線 AB との交点を E とする。 E が線分 AB を $(1+m) : m$ に外分するとき、次の問い合わせに答えよ。ただし、 $m > 0$ である。

- (1) $k > 2l$ が成り立つことを示せ。
- (2) m を k と l を用いて表せ。
- (3) 直線 CD と直線 OE との交点を P とするとき、 $\overrightarrow{OP} = s \overrightarrow{OE}$ を満たす s を k と l を用いて表せ。
- (4) $k = 3l$ のとき、前問 (3) の s を l を用いて表せ。

[解答欄]



(1) 直線 CD と直線 OE の交点を P とする。 $\angle DOP = \alpha$ とおけば、 $\angle ODC = \frac{\pi}{2} + \alpha$ なので $\angle OCD = \pi - (\frac{\pi}{2} + \alpha) - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{6} - \alpha$.

$$\therefore \sin(\frac{\pi}{6} - \alpha) = \frac{OP}{OC} = \frac{OP}{k}$$

他方、加法定理より

$$\begin{aligned} \sin(\frac{\pi}{6} - \alpha) &= \sin\frac{\pi}{6} \cos\alpha - \cos\frac{\pi}{6} \sin\alpha \\ &= \frac{1}{2} \frac{OP}{OD} - \frac{\sqrt{3}}{2} \frac{DP}{OD} = \frac{OP - \sqrt{3}OP}{2l} \end{aligned}$$

$$< \frac{OP}{2l} \quad \therefore \frac{OP}{k} < \frac{OP}{2l} \text{ なので}$$

$$\underline{k > 2l}$$

$$(2) \overrightarrow{OE} = \frac{-m \overrightarrow{OA} + (1+m) \overrightarrow{OB}}{1+m-m} = -m \overrightarrow{OA} + (1+m) \overrightarrow{OB}$$

$$\text{他方 } \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OC} = l \overrightarrow{OB} - k \overrightarrow{OA}.$$

$\overrightarrow{OE} \times \overrightarrow{CD}$ は垂直なので

$$\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{CD} = 0 \quad \text{だから}$$

$$\begin{aligned} 0 &= m k + (1+m) l - \{m l + (1+m) k\} \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} \\ &= m k + (1+m) l - \{m l + (1+m) k\} \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \{m(k+l) + 2l - k\} \\ \therefore m &= \frac{k-2l}{k+l} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (3) \overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{OB} &= -m \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} + (1+m) |\overrightarrow{OB}|^2 \\ &= -\frac{m}{2} + 1 + m = \frac{m}{2} + 1 \dots (1) \end{aligned}$$

他方、 $s > 0$ に注意して

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{OB} &= \overrightarrow{OE} \times \overrightarrow{OB} \cos \alpha \\ &= \overrightarrow{OE} \times \frac{\overrightarrow{OP}}{\overrightarrow{OD}} = \overrightarrow{OE} \times \frac{s \overrightarrow{OP}}{l} = \frac{s}{l} \overrightarrow{OE}^2 \dots (2) \end{aligned}$$

余弦定理より

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OE}^2 &= \overrightarrow{OA}^2 + \overrightarrow{AE}^2 - 2 \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{AE} \cos \frac{\pi}{3} \\ &= 1 + (1+m)^2 - 2(1+m) \frac{1}{2} = m^2 + m + 1 \end{aligned}$$

これを (2) へ代入して

$$\overrightarrow{OE} \cdot \overrightarrow{OB} = \frac{s}{l} (m^2 + m + 1) \dots (3)$$

(1), (3) より

$$s = \frac{l(\frac{m}{2} + 1)}{m^2 + m + 1} = \frac{kl(k+l)}{2(k^2 - kl + l^2)}$$

(4) $k = 3l$ のとき

$$s = \frac{3l^2 \times 4l}{2l^2(9-3+1)} = \frac{6}{7}l$$

→ 情報③ では (4) は

ありません (除外して下さい)。

数学

氏名		受験番号	
----	--	------	--

4

次の条件によって定まる数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ について答えよ。 n を正の整数とするとき,

$$a_1 = 1, \quad b_1 = \sqrt{2}, \quad a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2}, \quad b_{n+1} = \frac{2a_n b_n}{a_n + b_n}.$$

- (1) 不等式 $b_m < a_m$ を満たす正の整数 m をすべて求めよ。
- (2) $a_1, b_1, a_m, b_m, a_{m+1}, b_{m+1}$ の大小関係を不等号 $<$ を用いて表せ。ここで, m は 2 以上の整数である。
- (3) n を正の整数とするとき, 不等式 $|a_n - b_n| < 2^{(1-2^n)}$ が成り立つことを証明せよ。

[解答欄]

医4 情報4 物質環境4 電子機械4 (情報4, 物質環境)
では(3)は除外)

(1) $b_1 = \sqrt{2}, a_1 = 1$ より $b_1 < a_1$ は

成立しないので, m は 2 以上。

$$a_2 - b_2 = \frac{a_1 + b_1}{2} - \frac{2a_1 b_1}{a_1 + b_1} = \frac{(a_1 - b_1)^2}{2(a_1 + b_1)} > 0$$

2 以上の整数 m に対して (1), (2), (3) より

$a_m > b_m$ と仮定する。

$$a_{m+1} - b_{m+1} = \frac{a_m + b_m}{2} - \frac{2a_m b_m}{a_m + b_m} \quad \text{ところで } b_2 = \frac{2a_1 b_1}{a_1 + b_1} = \frac{2\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} > 1 = a_1$$

$$= \frac{(a_m - b_m)^2}{2(a_m + b_m)} > 0. \quad \text{なぜなら } \sqrt{2} > 1 \text{ より } 2\sqrt{2} > 1 + \sqrt{2}.$$

すべての正の整数 n について $\frac{2\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} > 1$ だから。

$$a_n > 0 \text{ かつ } b_n > 0 \text{ であることに注意。} \quad a_2 = \frac{\sqrt{2}}{b_2} = \sqrt{2} \frac{1+\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$$

したがって $b_m < a_m$ が成立する。さらに (1) より $a_2 = \frac{\sqrt{2}}{b_2} = \sqrt{2} \frac{1+\sqrt{2}}{2\sqrt{2}}$

のは m が 2 以上の任意の整数 のとき。= $\frac{1+\sqrt{2}}{2} < \frac{\sqrt{2} + \sqrt{2}}{2} = \sqrt{2} = b_1 \dots$ ⑥

(2) n を 1 以上の整数とする。

$$a_{n+1} b_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \times \frac{2a_n b_n}{a_n + b_n}$$

= $a_n b_n$ なので

$$a_{n+1} b_{n+1} = a_n b_n = \dots = a_2 b_2 < \frac{3}{2} - 1 = \frac{1}{2} = 2^{(1-2^1)} \text{ より 成立。}$$

$$= a_1 b_1 = \sqrt{2}. \quad \text{だから } b_n = \frac{\sqrt{2}}{a_n} \dots \text{ ①} \quad n=2 \text{ のとき } |a_2 - b_2| = a_2 - b_2$$

$$\text{さて } a_{n+1} - a_n = \frac{a_n + b_n}{2} - a_n = \frac{1+\sqrt{2}}{2} - \frac{2\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}} = \frac{5\sqrt{2}-7}{2} < 2^{(1-2^2)}$$

$$= \frac{b_n - a_n}{2} \text{ なので}$$

$(\therefore 2 < (\frac{29}{20})^2)$ 2 以上的整数 n について $|a_n - b_n| < 2^{(1-2^n)}$ を仮定。

$$a_2 - a_1 = \frac{b_1 - a_1}{2} = \frac{\sqrt{2} - 1}{2} > 0. \quad |a_{n+1} - b_{n+1}| = a_{n+1} - b_{n+1}$$

他方 m を 2 以上の整数とするとき $= \frac{(a_n - b_n)^2}{2(a_n + b_n)} < \frac{(a_n - b_n)^2}{2(b_n + b_n)}$

$$(1) \text{ より} \quad < \frac{(a_n - b_n)^2}{2 \cdot 2a_1} < \frac{(a_n - b_n)^2}{2} < \frac{1}{2} (2^{(1-2^n)})^2$$

$$a_{m+1} - a_m = \frac{b_m - a_m}{2} < 0 \quad \therefore = \frac{1}{2} 2^{(2-2^{n+1})} = 2^{(1-2^{n+1})}.$$

なので $a_{m+1} < a_m \dots$ ②

(m は 2 以上の整数)

$$(1) \text{ より} \quad \frac{\sqrt{2}}{b_{m+1}} < \frac{\sqrt{2}}{b_m} \text{ なので}$$

$n+1$ のときも成立。

したがって すべての正の整数 n について $|a_n - b_n| < 2^{(1-2^n)}$ が成立。

得点	
----	--

数学

氏名	
受験番号	

5

a, b, c, d を実数の定数とするとき、すべての実数 x で定義された関数 $f(x)$ について、次の問い合わせに答えよ。

$$f(x) = \begin{cases} x & (x \leq 0), \\ x^3 + ax^2 + bx + c & (0 < x \leq 1), \\ 0 & (1 < x \leq 2), \\ de^{-\frac{1}{x-2}} & (x > 2). \end{cases}$$

ここで、任意の正の実数 X と任意の正の整数 n について、 $e^X \geq \frac{X^n}{n!}$ が成り立つことを使ってよい。

- (1) 関数 $f(x)$ がすべての x で微分可能であるための、 a, b, c, d についての必要十分条件を求めよ。
- (2) a, b, c, d が上の(1)で与えられた必要十分条件を満たすとき、関数 $f(x)$ の $x=0, x=1, x=2$ における微分係数をそれぞれ求めよ。

[解答欄]

医 5 その1

(1) $f(x)$ はすべての x で微分可能と仮定する。したがってすべての x で連続である。ゆえに $x=0$ でも $x=1$ でも $x=2$ でも連続。

$x=0$ における連続性: まず $f(0)=0$.

$x<0$ のとき $f(x)=x \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0$)

$0 < x < 1$ のとき $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$

$\rightarrow c$ ($x \rightarrow 0$) ゆえに $c=0$... ①

$x=1$ における連続性:

①より $f(1)=a+b+1$.

$0 < x < 1$ のとき $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$

$\rightarrow a+b+1$ ($x \rightarrow 1$)

$1 < x < 2$ のとき $f(x)=0 \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 1$)

ゆえに $a+b+1=0$... ②

$x=2$ における連続性: まず $f(2)=0$.

①と②を使う.

$1 < x < 2$ のとき $f(x)=0 \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 2$)

$x > 2$ のとき $f(x)=de^{-\frac{1}{x-2}} \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 2$)

なぜなら $x > 2$ のとき

$$e^{-\frac{1}{x-2}} = \frac{1}{e^{\frac{1}{x-2}}} \leq \frac{1}{\frac{1}{x-2}} = x-2.$$

したがって $f(x)$ がすべての x で連続であれば ①と②が成立する。

次に 微分可能性。仮定より

$f(x)$ は $x=0$ でも $x=1$ でも $x=2$ でも 微分可能。

 $x=0$ における微分可能性:

$x < 0$ のとき

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \frac{x-0}{x} = 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$$

$0 < x < 1$ のとき ①, ②より

$$\frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \frac{x^3+ax^2+bx+c-0}{x} = x^2+ax+b \xrightarrow{x \rightarrow 0} b$$

$$\text{ゆえに } b=1 \xrightarrow{\text{③}} \text{②より } a=-2 \xrightarrow{\text{④}}$$

$$\text{このとき } f'(0)=1$$

 $x=1$ における微分可能性:

①, ③, ④を使う。 $f(1)=0$ に注意。

$0 < x < 1$ のとき

$$\frac{f(x)-f(1)}{x-1} = \frac{x^3+ax^2+bx+c-0}{x-1} = x^2+ax+b \xrightarrow{x \rightarrow 1} 1$$

$$= x^2-x \xrightarrow{x \rightarrow 1} 0$$

ゆえに $f'(1)=0$

 $x=2$ における微分可能性:

$f(2)=0$ に注意。

$1 < x < 2$ のとき

$$\frac{f(x)-f(2)}{x-2} = \frac{0-0}{x-2} = 0 \xrightarrow{x \rightarrow 2} 0$$

ゆえに $f'(2)=0$

$x > 2$ のとき

$$\frac{f(x)-f(2)}{x-2} = \frac{de^{-\frac{1}{x-2}}-0}{x-2} \xrightarrow{x \rightarrow 2} 0$$

$x > 2$ のとき

$$\frac{f(x)-f(2)}{x-2} = \frac{de^{-\frac{1}{x-2}}-0}{x-2} \xrightarrow{x \rightarrow 2} 0$$

得点	
----	--

数学

氏名	
受験番号	

5

a, b, c, d を実数の定数とするとき、すべての実数 x で定義された関数 $f(x)$ について、次の問い合わせに答えよ。

$$f(x) = \begin{cases} x & (x \leq 0), \\ x^3 + ax^2 + bx + c & (0 < x \leq 1), \\ 0 & (1 < x \leq 2), \\ de^{-\frac{1}{x-2}} & (x > 2). \end{cases}$$

ここで、任意の正の実数 X と任意の正の整数 n について、 $e^X \geq \frac{X^n}{n!}$ が成り立つことを使ってよい。

- (1) 関数 $f(x)$ がすべての x で微分可能であるための、 a, b, c, d についての必要十分条件を求めよ。
- (2) a, b, c, d が上の(1)で与えられた必要十分条件を満たすとき、関数 $f(x)$ の $x=0, x=1, x=2$ における微分係数をそれぞれ求めよ。

[解答欄]

[5] その2

なぜならば

$$\begin{aligned} \frac{e^{-\frac{1}{x-2}}}{x-2} &= \frac{1}{(x-2)e^{\frac{1}{x-2}}} \\ &\leq \frac{1}{(x-2)} \frac{\left(\frac{1}{x-2}\right)^2}{2!} = 2(x-2). \end{aligned}$$

ゆえに $f'(2) = 0$

したがって $f(x)$ がすべての x で
微分可能であるのは
 $a = -2$ かつ $b = 1$ かつ $c = 0$ かつ
 d は任意の実数となる。 ⑤

逆に ⑤ が満たされれば
 $f(x)$ はすべての x で 微分可能
であることがわかる。

したがって

$a = -2$ かつ $b = 1$ かつ $c = 0$
かつ d は任意の実数

(2) (1) より

$f'(0) = 1$, $f'(1) = 0$, $f'(2) = 0$

得点	
----	--